REGIONE MARCHE

Parco Naturale del CONERO

PARCO NATURALE DEL CONERO

PIANO FORESTALE (Periodo 1998-2007)

CARTA FORESTALE

E DELLE ALTRE OCCUPAZIONI ED USI DEL SUOLO

Scala 1:10000

m100 0 200 400 600 800 1000 m

Equidistanza tra le curve di livello m10

Lavoro coordinato e realizzato da:

I.P.L.A. S.p.a.
Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente
Corso Casale 476 - TORINO

per il Parco del Conero:
Elaborazione delle linee di indirizzo e coordinamento amministrativo: S. Cavalli
Assistenza tecnica amministrativa: S. Verdini, N. Orsini, M. Zannini

Definizione metodologica, rilevamento e cartografia tematica:
P. Terzuolo, G. Bertetti, P. Camerano, P. Varese*.

Realizzazione cartografia numerica:
L. Gribaudo, F. Mensio, G. Nicoli, S. Guerci**

* *Consulenti IPLA* ** *Collaboratori IPLA*

Fotointerpretazione e rilievi effettuati nell'anno 1997 alla scala 1:10.000.

L'occupazione del suolo riportata sulla carta è stata derivata dai dati forniti dal Servizio Cartografico della Regione Marche (voli effettuati negli anni 1984-87), con integrazioni e aggiornamenti eseguiti dall'IPLA nel corso dei rilievi per il Piano Forestale. Tali aggiornamenti riguardano in modo particolare le aree boscate.
L'altimetria in formato numerico è stata anch'essa fornita dal Servizio Cartografico della Regione Marche.

Allestimento cartografico digitale e stampa: S.E.L.C.A. Via R. Giuliani, 153 - Firenze - 1999

Prima Edizione 1999

Localizzazione geografica



Territori comunali costituenti il Parco



AREE BOSCATE

OSTRIETI

OS — Ostrieto in stazioni di impluvio con roverella subordinata, in prevalenza a ceduo invecchiato

QUERCETI DI ROVERELLA

QX — Querceto di roverella, sottotipo xerofilo con ginestre, a fustaia rada o sopra ceduo invecchiato

QR — Querceto di roverella, sottotipo mesoxerofilo con carpino nero, in prevalenza a ceduo sotto fustaia

LECCETE

QM — Lecceta mesoxerofila con latifoglie decidue (roverella, carpino nero, ornielo, sorbi), a ceduo matricinato invecchiato

QI — Lecceta ipsexerofila, a macchia in libera evoluzione

QT — Lecceta xerofila con sporadiche caducifoglie, a ceduo invecchiato

RIMBOSCHIMENTI

RC — Rimboschimento a prevalenza di pino d'Aleppo, talora come rinfoltimento di leccete degradate, risalente al secondo dopoguerra

RL — Rimboschimento di pino d'Aleppo e leccio con altre latifoglie eseguito in prevalenza negli anni '30, a diversi stadi di sviluppo ed evoluzione

RM — Rimboschimento misto di conifere e latifoglie a composizione e stadi di sviluppo variabili localmente

FASCE BOSCATE

FB — Fasce boscate e boschetti di latifoglie miste, in prevalenza mesofile (lembi di querceti di roverella e ostrieti, saliceti e pioppeti con arbusti e rovi) lungo i corsi d'acqua e gli impluvi, talora esotiche naturalizzate (ailanteti, robinieti, pinete di pino d'Aleppo) od a margine dei coltivi su incolti e ripe, con nuclei di canneti

CENOSI DI RICOLONIZZAZIONE FORESTALE

Formazioni a diversi stadi di ricolonizzazione forestale spontanea di coltivi abbandonati, arbustiva (ginestra, ginepro, pruni, sanguinello, rose, rovi, canne ecc.) ed arborea di specie autoctone (roverella, ornielo, carpino nero, leccio) o naturalizzate (pino d'Aleppo, robinia, ailanto) con gruppi derivati da alberi preesistenti o filari intercalari alle colture agrarie (olivagio, olmo, ornielo, roverella ecc.)

ALTRE OCCUPAZIONI ED USI DEL SUOLO

VEGETAZIONE DELLE ROCCE

AP — Vegetazione delle pareti rocciose e dei macereti

AS — Vegetazione dei pendii marnoso-arenacei a prevalenza di ginestra e Arundo plinlana, talora con nuclei arborati (pino d'Aleppo, ornielo, olmo, olivagio ecc.) spontanei o relitti di imboschimenti protettivi falliti

PRATERIE

Praterie di origine antropica (brometi), con arbusti tendenti alla garriga od in fase di colonizzazione arborea, irregolarmente pascolate, talora derivate da pregressi seminativi

AREE CON SUBSTRATO GEOLOGICO AFFIORANTE

Aree estrattive di calcari abbandonate, parzialmente in corso di ricolonizzazione spontanea erbacea, arbustiva (ginestra, ginepro, rovi, clematidi ecc.) ed arborea (pino d'Aleppo, ornielo) a diversi stadi di evoluzione, localmente recuperate (es. ex cava di Massignano)

Rocce, accumuli detritici e pendii marnosi prevalentemente nudi o con vegetazione discontinua, spiagge

ACQUE

Acque interne

IMBOSCHIMENTI RECENTI

Giovani impianti a prevalenza di latifoglie spontanee miste od arboricoltura da legno

COLTIVI ABBANDONATI

Coltivi di abbandono recente o a riposo colonizzati da alte erbe, arbusti o giovani alberi

COLTURE LEGNOSE AGRARIE

Vigneti e frutteti

Oliveti

SEMINATIVI

Seminativi nudi anche a riposo e colture orticole

Seminativi arborati, anche a riposo

AREE URBANE, INFRASTRUTTURE E RELATIVE PERTINENZE

Edificati residenziali con parchi e giardini annessi, aree in trasformazione ed altre infrastrutture

Edificati produttivi, anche agricoli e infrastrutture di servizi

Attrezzature turistiche e ricreative

Stadio

Campo da golf

Strade asfaltate con eventuale presenza di formazioni lineari miste arboree e/o arbustive

Strade sterrate con eventuali formazioni lineari miste arboree e/o arbustive, altre strade, piste e viabilità minore di interesse prevalentemente forestale

Viabilità pedonale (sentieri)

Elettrodotti

Confine di Provincia

Confine di Comune

Confine del Parco Regionale del Conero

Riserva integrale

Riserva generale orientata

1..34 — Particellare forestale e relativa numerazione

Nota: *Nei casi in cui due o più limiti si sovrappongono l'ordine di lettura è il seguente: limite di riserva, strade, particellare forestale*